

接種

季預防

性流感疫苗 流行性感

衛生局每年季前為特元
伯爵綜合醫院接站、音

人士免
衛生中心、鏡

季性流感疫苗，合資格人士可按背頁的指示前往仁
醫院接種站、工人醫療所和科大醫院門診接種。

疫苗資訊

疫苗為滅活疫苗，採用過
流病毒成份，即甲型H1N1

去數十年
使用自

型H3N2的方法製作。2018-2019年季節性流感疫苗包含四種
H1N1和兩種乙型流感。

接種劑數

歲及以上人士只需接種一
劑，意間隔至少1個月。

劑，6個
月至9

歲以下且過往從未接種的兒童則需要接種兩劑，但之

疫苗的副作用

流感疫苗有極低的完全無效
包括低熱、發冷、肌肉痠痛
長。

來，但和
痛、頭痛

任何藥
或注射物一樣，流感疫苗亦有副作用。常見的副作用輕微，
對部位疼痛和紅腫等。這些症狀一般只會持續一至兩

極為罕見的情況下，對疫苗中的
佐林-巴利綜合症是一種自
成呼吸道感染有關。這種
關係。即使某些研究顯示

疫苗中的
成份能
圍神經炎
疾病可出
能和流

過敏的人士，可能會出現嚴重的過敏反應。
現在病，常見於中老年，大多數病因不明，可能和消化道
感疫苗接種流感疫苗後，科學上尚不確定和流感疫苗之間的
有關係，但其機率亦小於百萬分之一。

禁忌症

- 有以下情況的人士不應接種
- 以前接種任何疫苗後出現過嚴重過敏反應
- 對疫苗任何成份過敏
- 對蛋或雞的蛋白過敏
- 對蛋或雞的蛋白過敏
- 正在患中重度的發熱
- 有疑問，應在接種前向醫

種流
後出現
性反應
用蛋或
雞肉後
性疾
務人員
查詢

疫苗
敏性反
反應或其他嚴重不良的反應
出現口唇腫脹、蕁麻疹、哮喘/呼吸困難等)

